

METHIONIN

THUỐC KÊ ĐƠN, THUỐC NÀY CHỈ SỬ DỤNG THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA BÁC SĨ

*** THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang chứa

- Methionin 250 mg
- Tá dược: Tinh bột mì, Talc, Magnesi stearatvừa đủ 1 viên nang

*** DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang.

*** QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:**

- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang.
- Chai 100 viên nang.

*** CHỈ ĐỊNH:**

- Điều trị quá liều paracetamol khi không có acetylcystein. Ngoài ra còn dùng để toan hóa nước tiểu.

*** CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:** Dùng uống

- Điều trị quá liều paracetamol: Liều ban đầu là 2,5 g x 3 lần/ngày, cách 4 giờ. Điều trị phụ thuộc vào nồng độ paracetamol trong huyết tương. Cần tiến hành điều trị chậm nhất là 10 đến 12 giờ sau khi uống paracetamol.
- Nên uống thuốc trong bữa ăn hoặc khi đang no.

*** CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Người bệnh bị nhiễm toan.
- Tổn thương gan nặng.

*** DƯỢC LỰC HỌC:**

Methionin là một acid amin thiết yếu có trong thành phần của chế độ ăn và trong công thức của các chế phẩm đa acid amin để nuôi dưỡng. Methionin tăng cường tổng hợp glutathion và được sử dụng thay thế cho acetylcystein để điều trị ngộ độc paracetamol để phòng tổn thương gan. Methionin còn dùng theo đường uống để làm giảm pH nước tiểu.

*** DƯỢC ĐỘNG HỌC:**

Methionin được chuyển hóa ở gan.

*** THẬN TRỌNG:**

- Ở những người bệnh đã bị suy gan, methionin có thể làm cho tổn thương gan nặng thêm. Cần thận trọng khi dùng methionin cho người bị bệnh gan nặng.
- Ở những người bệnh đã bị suy gan/ tổn thương gan, methionin có thể làm bệnh về não do gan tiến triển mạnh. Không được dùng methionin để điều trị ngộ độc paracetamol nếu đã quá 12 giờ tính từ lúc uống thuốc quá liều.

*** TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Methionin có thể làm giảm tác dụng của levodopa. Cần tránh dùng Methionin liều cao ở người bệnh đang được điều trị bằng Levodopa.

*** TÁC DỤNG PHỤ:**

- Buồn nôn, nôn, ngủ gà, dễ bị kích thích.
 - Gây nhiễm toan chuyển hóa và tăng nitơ huyết ở người bị suy chức năng thận.
- Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

*** KHUYẾN CÁO:**

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.
- Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.
- Để xa tầm tay trẻ em.

*** BẢO QUẢN:** Ở nhiệt độ từ 5 – 25⁰C, tránh ánh sáng.

- Hạn dùng: 48 tháng kể từ ngày sản xuất.

*** TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** Tiêu chuẩn cơ sở.