

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

DOMERIC®

- **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**
- **Để xa tầm tay trẻ em.**
- **Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén chứa:

- Cao Nghệ (tương đương 800 mg nghệ tươi - *Rhizoma Curcumaelongae*) 40 mg
- Tá dược: Methyl parapen, Propyl parapen, Lactose, Tinh bột mì, Colloidal silicon dioxid A200, Calci carbonat, Gôm Arabic, Microcrystallin cellulose PH101, Magnesi stearat, Natri starch glycolat.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 10 vỉ x 10 viên.
- Hộp 1 chai 50 viên, hộp 1 chai 200 viên.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

Nhóm dược lý: Thuốc từ dược liệu.

Mã ATC: Không

Hành khí, chỉ thống, phá huyết, thông kinh, tiêu mủ, lên da non; chủ trị kinh nguyệt không đều, bế kinh, ứ máu, vùng ngực bụng khí trướng đau tức, đau liên sườn dưới, khó thở, sau khi sanh máu xấu không ra, kết hòn cục, đau bụng; thương tổn ứ huyết, viêm loét dạ dày; ung nhọt, ghẻ, lở; phong thấp, tay chân đau nhức.

CHỈ ĐỊNH:

Kích thích tiêu hóa, hỗ trợ điều trị các bệnh về gan và viêm loét dạ dày tá tràng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Cách dùng: Dùng uống trước bữa ăn, khi đau, khó tiêu hoặc dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Liều dùng:

- Người lớn: 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Chưa có nhiều dữ liệu về sự an toàn khi dùng cho trẻ em. Tốt hơn nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh không có ứ huyết không nên dùng.

- Người có rối loạn đông máu, đang có chảy máu, cơ thể suy nhược.

- Người loét dạ dày do HP, người rối loạn chuyển hóa lactose.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Chưa có báo cáo.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác):

Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi hoặc chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, làm việc trên cao và các trường hợp khác.

TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TÁC KHÁC:

Không dùng cùng thuốc chỉ huyết.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR):

Chưa phát hiện về tác dụng phụ của thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Triệu chứng và biểu hiện khi sử dụng thuốc quá liều:

Chưa có báo cáo.

Cách xử trí quá liều

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

CƠ SỞ SẢN XUẤT:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cần Lố, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851950

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: 22/06/2017.



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO BỆNH NHÂN

DOMERIC®

- **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**
- **Để xa tầm tay trẻ em.**
- **Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**
- **Hãy giữ lại tờ hướng dẫn sử dụng; bạn có thể cần phải đọc lại.**

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC:

Mỗi viên nén chứa:

- Cao Nghệ (tương đương 800 mg nghệ tươi - *Rhizoma Curcumaelongae*) 40 mg
- Tá dược: Methyl parapen, Propyl parapen, Lactose, Tinh bột mì, Colloidal silicon dioxid A200, Calci carbonat, Gôm Arabic, Microcrystallin cellulose PH101, Magnesi stearat, Natri starch glycolat.

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Dạng bào chế: Viên nén.

Hình thức: Viên nén màu vàng, hình tròn, mặt lồi, đường kính 10,5 mm, trên viên một mặt khắc vạch, hình sao và số 4618, cạnh và thành viên lành lặn.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 10 vỉ x 10 viên.
- Hộp 1 chai 50 viên, hộp 1 chai 200 viên.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ?

Kích thích tiêu hóa, hỗ trợ điều trị các bệnh về gan và viêm loét dạ dày tá tràng.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG?

Đường dùng: Đường uống.

Cách dùng: Dùng uống trước bữa ăn, khi đau, khó tiêu hoặc dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Liều thường dùng:

- Người lớn: 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Chưa có nhiều dữ liệu về sự an toàn khi dùng cho trẻ em. Tốt hơn nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY?

Nếu bạn:
- Phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh không có ứ huyết không nên dùng.

- Người có rối loạn đông máu, đang có chảy máu, cơ thể suy nhược.

- Người loét dạ dày do HP, người rối loạn chuyển hóa lactose.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa phát hiện về tác dụng phụ của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu tác dụng không mong muốn nào trở nên nghiêm trọng hoặc nếu bạn phát hiện tác dụng không mong muốn chưa được đề cập trong tờ hướng dẫn này, hãy báo cáo cho bác sĩ của bạn biết.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY?

Thực phẩm: Thức ăn và đồ uống không có ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

Dùng các thuốc khác:

Không dùng cùng thuốc chỉ huyết.

CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC?

Nếu bạn quên uống một liều dùng, hãy uống ngay khi nhớ ra. Nếu thời gian gần với lần dùng thuốc tiếp theo, bỏ qua liều đã quên và hãy dùng liều tiếp theo vào thời gian thường lệ. Không dùng liều gấp đôi để bù vào liều đã quên.

CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Bảo quản thuốc nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng.

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU?

Chưa có báo cáo.

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO?

Cách xử trí quá liều

- Nếu bạn hay bất kỳ ai khác (như trẻ em) uống quá nhiều viên thuốc, hãy gặp ngay bác sĩ hoặc tới khoa Hồi sức - Cấp cứu của bệnh viện gần nhất.

- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY:

Chưa có báo cáo.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác):

Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi hoặc chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, làm việc trên cao và các trường hợp khác.

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ?

Tờ hướng dẫn sử dụng nêu tóm tắt các thông tin quan trọng của thuốc. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

CƠ SỞ SẢN XUẤT:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cần Lố, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851950

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: 22/06/2017.

