

# DOGARLIC®

## THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa:

- Cao Tỏi 5/1 (tương đương 700 mg Tỏi - *Bulbus Allii sativi*) .....140 mg
- Cao Nghệ 4/1 (tương đương 60 mg Nghệ - *Rhizoma Curcumae longa*) ..... 15 mg
- Tá dược: Lactose, Tinh bột mì, Povidon K90, Colloidal silicon dioxide A200, Natri benzoat, Nipagin, Nipasol, Natri starch glycolat, Talc, Magnesi stearat.

**DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nén.

## QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 20 vỉ x 10 viên.
- Hộp 1 chai x 50 viên, hộp 1 chai x 100 viên.

## CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị tăng lipid máu (cholesterol và triglycerid) khi không điều chỉnh được bằng chế độ ăn uống.
- Phòng ngừa xơ vữa động mạch.

## LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Dùng 3 - 4 viên/ngày, chia 2 lần sau bữa ăn hoặc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.
- Có thể sử dụng thời gian dài trong phòng ngừa xơ vữa động mạch.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

## THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

Sử dụng nhiều Tỏi có thể làm tăng nguy cơ chảy máu sau phẫu thuật.

## PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai khi không có chỉ định của bác sĩ.
- Tỏi bài tiết qua sữa mẹ và tác dụng trên trẻ sơ sinh chưa được nghiên cứu. Không nên dùng khi không có chỉ định của bác sĩ.

## ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc.

## TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

- Dùng đồng thời với warfarin có thể làm tăng thời gian chảy máu.
- Nhằm tránh các tương tác có thể xảy ra giữa các thuốc, nên báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ các thuốc khác đang sử dụng.

## TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Thuốc có thể gây viêm da tiếp xúc, gây cơn hen suyễn khi hít phải, dị ứng, kích ứng đường tiêu hóa, ợ nóng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, có mùi Tỏi trong hơi thở và ở da.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

## QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo liên quan đến quá liều của thuốc. Không có phản ứng có hại, tuy nhiên cần phải sử dụng đúng liều chỉ định.

## ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

Tỏi có tác dụng chống xơ vữa động mạch, hạ lipid huyết, chống sự tăng huyết áp, chống lại sự kết tập tiểu cầu, giãn mạch và là chất chống oxy hóa hiệu quả.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

**NEU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.**

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.**

## NHÀ SẢN XUẤT:



DOMESCO

## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cấn Lỗ, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp  
Điện thoại: 1800.969.660.