

ÍCH MẪU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO BỆNH NHÂN

- **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**
- **Đề xa tầm tay trẻ em.**
- **Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**
- **Hãy giữ lại tờ hướng dẫn sử dụng; bạn có thể cần phải đọc lại.**

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC:

Mỗi viên nang cứng chứa:

Cao lỏng dược liệu 130 mg
(tương đương 1050 mg Ích mẫu – *Herba Leonuri japonici*
150 mg Hương phụ – *Rhizoma Cyperi*
100 mg Ngải cứu – *Herba Artemisiae vulgaris*)

- Tá dược: Natri benzoat, Lactose, Tinh bột mì, Colloidal silicon dioxit A200, Canxi carbonat, Gôm arabic, Màu caramel, Magnesi stearat, Nang cứng gelatin (số 0).

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Hình thức: Viên nang cứng số 0, thân nang màu đỏ, nắp nang màu đỏ. Bột thuốc có màu nâu, có mùi thơm dược liệu.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ?

- Kinh nguyệt không đều, đau bụng khi hành kinh, rong kinh, rối loạn kinh nguyệt.

- Khí hư bạch đới quá nhiều; tử cung co hồi không tốt sau khi sinh.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG?

Đường dùng: Đường uống.

Cách dùng: Dùng uống

Liều thường dùng:

Uống 1 viên/lần, ngày 3 lần.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY?

Nếu bạn mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa có tài liệu ghi nhận về tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu bạn phát hiện tác dụng không mong muốn chưa được đề cập trong tờ hướng dẫn này, hãy báo cáo cho bác sĩ của bạn biết.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY?

Thực phẩm: Thức ăn và đồ uống không có ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

Dùng các thuốc khác:

Chưa có tài liệu ghi nhận về sự tương tác thuốc.

CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC?

Nếu bạn quên uống một liều dùng, hãy uống ngay khi nhớ ra. Nếu thời gian gần với lần dùng thuốc tiếp theo, bỏ qua liều đã quên và hãy dùng liều tiếp theo vào thời gian thường lệ. Không dùng liều gấp đôi để bù vào liều đã quên.

CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Bảo quản thuốc nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng.

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU?

Chưa có báo cáo liên quan đến quá liều của thuốc. Tuy nhiên cần phải sử dụng đúng liều chỉ định.

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO?

Cách xử trí quá liều

- Nếu bạn hay bất kỳ ai khác (như trẻ em) uống quá nhiều viên thuốc, hãy gặp ngay bác sĩ hoặc tới khoa Hồi sức - Cấp cứu của bệnh viện gần nhất.

- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY:

Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

- Thời kỳ mang thai: Chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

- Thời kỳ cho con bú: Chưa có nghiên cứu về sự bài tiết của thuốc trong sữa mẹ và tác dụng của thuốc trên trẻ sơ sinh, vì vậy nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác):

Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, làm việc trên cao và các trường hợp khác.

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ?

Tờ hướng dẫn sử dụng nêu tóm tắt các thông tin quan trọng của thuốc. Nếu bạn có thắc mắc nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

- Thời kỳ mang thai: Chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

- Thời kỳ cho con bú: Chưa có nghiên cứu về sự bài tiết của thuốc trong sữa mẹ và tác dụng của thuốc trên trẻ sơ sinh, vì vậy nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác):

Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác.

TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TÁC KHÁC:

Chưa có tài liệu ghi nhận về sự tương tác thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR):

Chưa có tài liệu ghi nhận về tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo liên quan đến quá liều của thuốc. Tuy nhiên cần phải sử dụng đúng liều chỉ định.

Cách xử trí quá liều

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

CƠ SỞ SẢN XUẤT:



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cẩn Lễ, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 067. 3851950

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: 15/11/2016

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

Nhóm dược lý: Thuốc từ dược liệu.

Mã ATC: Không

Ích mẫu có tác dụng hoạt huyết, điều kinh, khử ú, tiêu thủy, được dùng làm thuốc chữa rong kinh, tử cung co hồi không tốt, rối loạn kinh nguyệt, kinh bế, đau kinh, khí hư bạch đới quá nhiều. Ngải cứu được dùng chữa kinh nguyệt không đều, đau kinh, bụng lạnh đau, nôn mửa đi lỵ, thổ huyết, chảy máu cam, đa kinh, tiểu ra máu, bạch đới, đau dây thần kinh, phong thấp và ghê lở. Hương phụ được dùng làm thuốc điều kinh, giảm đau, chữa kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, viêm tử cung mạn tính, băng lậu đới hạ, còn là thuốc kiện tỳ vị, chữa can vị bất hòa, đau dạ dày, ăn không ngon, tiêu hóa kém, nôn mửa.

CHỈ ĐỊNH:

- Kinh nguyệt không đều, đau bụng khi hành kinh, rong kinh, rối loạn kinh nguyệt.

- Khí hư bạch đới quá nhiều; tử cung co hồi không tốt sau khi sinh.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Cách dùng: Dùng uống

Liều dùng: Uống 1 viên/lần, ngày 3 lần.